

## بیمار عزیز :

شما کاندید انجام آندوسکوپی هستید . در این آزمون از یک لوله انعطاف پذیر برای رویت مستقیم ساختمان داخلی مری و معده شما استفاده می شود . گاهی از طریق آندوسکوپ می توان اجسام خارجی و یا ترشحات را از مری و یا معده ساکشن کرد و یا نمونه برداری انجام داد .

این آزمون تحت بی حسی موضعی یا داخل وریدی در بخش آندوسکوپی بیمارستان صورت می گیرد .



## قبل از آزمون :

- لازم است رضایت نامه مربوط به انجام پروسیجر را امضاء نمایید .
- ۶-۸ ساعت قبل از آزمون ناشتا باشید.
- قبل از آزمون دندان های مصنوعی و جواهرات خود را خارج نمایید .
- از داروهای آرام بخش برای کاهش اضطراب و از مسکن برای تحمل بهتر آندوسکوپی شما استفاده خواهد شد .
- بهداشت دهان را رعایت کنید زیرا لوله آندوسکوپ از دهان به سمت مری و معده هدایت خواهد شد .
- قبل از آزمون باید مثانه خود را تخلیه کنید .
- علائم حیاتی شما کنترل و ثبت خواهد شد .

## - حین انجام آزمون :

- از شما خواسته می شود لباس های خود را درآورید و گان بیمارستان را به تن کنید .


- در صورت لزوم از مسکن های تزریقی برای انجام بدون درد آندوسکوپی استفاده می شود .
- شما بر روی تخت آندوسکوپی در وضعیت خوابیده به پهلو چپ قرار خواهید گرفت .
- دهان و حلق شما به طور موضعی توسط محلول لیدوکائین یا سایر اسپری های بی حسی کننده بی حس خواهد شد . این کار برای کاهش رفلکس اق زدن انجام میشود .
- گاهی برای دیدن بهتر معده ، مقداری هوا به داخل معده تزریق خواهد شد که ممکن است شما احساس پری در معده کنید .
- پس از تکمیل شدن آزمون ، هوای اضافی و ترشحات لوله گوارش از طریق دستگاه آندوسکوپ خارج خواهد شد .



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  
درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی ولایت

آندوسکوپی



دفتر پرستاری

واحد آموزش

راهنمای آموزش بیماران

با آرزوی سلامتی و بهبودی

پس از آزمون :

- تا زمان برگشت رفلکس اق زدن ، از خوردن و آشامیدن مواد غذایی خودداری کنید .
- به منظور کاهش ناراحتی گلو ممکن است برای شما قرص مسکن تجویز شود .
- از مصرف مایعات ولرم برای رفع گلو درد می توانید استفاده کنید .
- داروهای خواب آور ممکن است مختصری موجب خواب آلودگی و کاهش هوشیاری شما بشود . توصیه می شود تا هوشیاری کامل از رانندگی خودداری کنید .